

Oddělení klinické biochemie - Stanovení hladin antibiotik (HPLC)
KREV

NS:		Datum:		Razítko (IČP):	
Telefon:					
Č.P.					
Jméno:					
Pojišťovna:				Podpis lékaře:	
Dg. k indikaci ATB th.:				Odbornost lékaře:	
Dg. resp. ATB th. podložena mikrobiologickým vyšetřením		ANO		NE	
Výběr ATB konzultován s OKMI		ANO		NE	

NEZBYTNOU PODMÍNKOU VYŠETŘENÍ JE UVEDENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ A DÁVKOVÁNÍ

Antibiotikum	název přípravku	datum odběru	čas odběru	odběr provedl/a	zahájení léčby (datum)		denní dávka (mg)		čas posl. dávky	dávka (mg)	počet dávek/den
Meropenem*						Kontinuální podávání		Intermitentní (nekontinuální) podávání			
Piperacilin											
Cefepim											
Daptomycin**											
Linezolid									i.v. / p.o.		

Poznámky:
Současně podávaná medikace - zaškrtněte:
1) nefrotoxická medikace - specifikujte:

- ☐ vankomycin, aminoglykosidy, kolistin, furosemid, ACEi, NSAIDs, cyklosporin, methotrexát, cidofovir, foskarnet, acyclovir a deriváty
- ☐ kontrastní látky:
- ☐ cytostatika konkrétně:
- ☐ jiné:

2) medikace s významným interakčním potenciálem pro meropenem: valproát

- ☐ ANO
- ☐ NE

* z důvodu stability odeslat vzorek na ÚLM-OKB bezprostředně po odběru

Odběr. zkumavky (klasické pro biochemická vyšetření, min. objem 2,7 ml): Li-Heparin-Gel (oranžový uzávěr)

** Daptomycin odebraný do Li-heparin **bez gelu**

Speciální podmínky odběru viz Laboratorní příručka ÚLM-OKB