

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200182720

ERD

ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 236 g 221 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.



A

RhD NEG

ccEe Cw- K-

Odebráno: 24.01.2022

Použitelné do:
07.03.2022 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102202704790

ERD

ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 261 g 244 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
OZÁŘENO.

O

RhD POZIT

Ccee Cw- K- Jka-

Odebráno: 29.11.2022

Použitelné do:
15.12.2022 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022113146⁵¹		O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 241 g 225 ml 1/2 TU Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 01.12.2022 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.		Použitelné do: 12.01.2023 23:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022309515⁹⁰		O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 230 g 215 ml 1/2 TU Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 19.12.2022 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. OZÁŘENO.		Použitelné do: 04.01.2023 23:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022113146⁵²		 O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 43 g 40 ml 1 ks Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % pině krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 01.12.2022 	
		Použitelné do: 12.01.2023 23:59 	
PEDIATRICKÁ JEDNOTKA. Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022026859⁹⁰		 O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 60 g 56 ml 1 ks Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % pině krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K- Jka+ M+	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 28.11.2022 	
		Použitelné do: 15.12.2022 23:59 	
PEDIATRICKÁ JEDNOTKA. Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. OZÁŘENO.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022002987⁸⁰

EP



ERYTHROCYTY PROMYTE

Množství: 273 g 255 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,40 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 80 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Vyrobeno z ERD. Promyto v SSP+

O

RhD POZIT

Ccee Cw- K-

Odebráno: 07.02.2022

Použitelné do:
13.02.2022 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201015017151⁹¹

EP



ERYTHROCYTY PROMYTE

Množství: 230 g 213 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,40 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 80 ml SAGMVYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
OZÁŘENO. Vyrobeno z ERD. Promyto v SSP+

B

RhD POZIT

K-

Odebráno: 13.11.2015

Použitelné do:
11.12.2015 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102131445170		O	
EDU  ERYTHROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ PRO INTRAUTERINNÍ TRANSFUZI		RhD NEG	
Množství: 89 g 83 ml 1 T.U. Hematokrit 0,70 až 0,85 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 11.11.2021 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. Určeno pro IUT.		Použitelné do: 16.11.2021 07:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102211151690		O	
EDU  ERYTHROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ PRO INTRAUTERINNÍ TRANSFUZI		RhD NEG	
Množství: 121 g 112 ml 1 T.U. Hematokrit 0,70 až 0,85 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 24.10.2022 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. OZÁŘENO. Určeno pro IUT.		Použitelné do: 27.10.2022 12:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200254940

TADR

TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM
ROZTOKU

Množství: 210 g 204 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z aferézy

Použití roztok ACDA

Zpracováno ve 250 ml SSP+

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

Třepejte.

A

RhD NEG

ccEe Cw- K-

Odebráno: 01.02.2022



Použitelné do:

06.02.2022 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102202697190

TADR

TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM
ROZTOKU

Množství: 201 g 195 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z aferézy

Použití roztok ACDA

Zpracováno ve 250 ml SSP+

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

OZÁŘENO. Třepejte.

B

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 29.11.2022



Použitelné do:

04.12.2022 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201022 600487³⁰**TBSDR**TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ (V
NAHRADNÍM ROZTOKU)Množství: **315 g 306 ml 1 TD**Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
Třepejte.**O****RhD POZIT**Odebráno: **10.02.2022**

Použitelné do:

15.02.2022 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201022 605473⁹⁰**TBSDR**TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ (V
NAHRADNÍM ROZTOKU)Množství: **309 g 300 ml 1 TD**Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
OZÁŘENO. Třepejte.**B****RhD NEG**Odebráno: **29.11.2022**

Použitelné do:

04.12.2022 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022600544⁵⁰

TBSDKZ

TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMESNÉ DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ ZMRAŽENÉ
Množství: 27 g 26 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z 4 odběrů,

Odebráno do 63 ml CPD

Zpracováno ve 250 ml SSP+

Kryokonzervační roztok DMSO 5%

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Snížený obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě méně než -80°C.

Přpravujte při teplotě méně než -40°C.



O

RhD POZIT

Odebráno: 15.02.2022



Použitelné do:

17.02.2024 23:59



22600544 50



TBSDKZ

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201020602185⁵¹

TBSDK

TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMESNÉ DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ

Množství: 273 g 270 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z 4 odběrů,

Odebráno do 63 ml CPD

Zpracováno ve 250 ml SSP+

Kryokonzervační roztok DMSO 0,5%

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Snížený obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě +20°C až +24°C.

Třepejte.



O

RhD POZIT

Odebráno: 15.06.2020



Použitelné do:

08.02.2022 06:13



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102200501710		A	
P PLAZMA		RhD POZIT Ccee Cw- K- Fy(a-b+) Jkb+ M+N- S-	
Množství: 257 g 251 ml 1 T.U.		Odebráno: 03.03.2022 	
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Snižené riziko TRALI.		Použitelné do: 02.03.2025 23:59 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH	VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ		
Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C. Po rozmrazení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102200053810		B	
P PLAZMA		RhD POZIT Ccee Cw- K-	
Množství: 262 g 255 ml 1 T.U.		Odebráno: 07.01.2022 	
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Snižené riziko TRALI.		Použitelné do: 14.11.2022 16:09 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH	VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ		
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200501710

P



PLAZMA

Množství: 257 g 251 ml 1 T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD

S

Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.

A

RhD POZIT

Ccee Cw- K- Fy(a-b+)
Jkb+ M+N- S-

Odebráno: 03.03.2022



Použitelné do:

02.03.2025 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200501710

P



PLAZMA

Množství: 257 g 251 ml 1 T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Sniženo riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHSkladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.

A

RhD POZIT

Ccee Cw- K- Fy(a-b+)
Jkb+ M+N- S-

Odebráno: 03.03.2022



Použitelné do:

02.03.2025 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200501930

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 226 g 220 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok NA-CITRAT
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ

O

RhD NEG

ccee Cw- Kk

Odebráno: 03.03.2022



Použitelné do:

02.03.2025 23:59

Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102200064531

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 232 g 226 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok NA-CITRAT
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ

A

RhD POZIT

CcEe Cw- K-

Odebráno: 10.01.2022



Použitelné do:

02.11.2022 15:15

Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C20102200501930

PA

PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 226 g 220 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok NA-CITRAT
Sniženo riziko TRALI

O

RhD NEG

ccee Cw- Kk

Odebráno: 03.03.2022



Použitelné do:

02.03.2025 23:59

Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C20102200501930

PA

PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 226 g 220 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok NA-CITRAT
Sniženo riziko TRALIVYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECH

O

RhD NEG

ccee Cw- Kk

Odebráno: 03.03.2022



Použitelné do:

02.03.2025 23:59

Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102102763570

PAI

PLAZMA Z AFEREZY
PATOGEN-INKTIVOVANÁ

Množství: 243 g 237 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok ACD-AVYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHSkladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmrazení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte.
Patogen inaktivováno zpracováním s 35 ml roztoku riboflavinu.

A

RhD POZIT

CCee Cw- Kk

Odebráno: 09.12.2021



Použitelné do:

08.12.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102102785470

PAI

PLAZMA Z AFEREZY
PATOGEN-INKTIVOVANÁ

Množství: 243 g 237 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok NA-CITRAT
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku.
Patogen inaktivováno zpracováním s 35 ml roztoku riboflavinu.

O

RhD POZIT

Ccee Cw- Kk

Odebráno: 13.12.2021



Použitelné do:

01.11.2022 14:44



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
C. přípravku

C20102111376070

PI



PLAZMA PATOGEN-INKTIVOVANA

Množství: 278 g 271 ml 1 T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHSkladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte.
Patogen inaktivováno zpracováním s 35 ml roztoku riboflavinu.

O

RhD POZIT

CCee Cw- K-

Odebráno: 02.12.2021



Použitelné do:

01.12.2024 23:59



rozmrazeno

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku		
		
C20102200393570		AB RhD POZIT
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		CcEe Cw- K-
Množství: 207 g 202 ml 1 T.U.		Odebráno: 17.02.2022
Vyrobeno z aferézy Použit roztok ACD-A Snížené riziko TRALI.		
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH	VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ	Použitelné do: 16.02.2025 23:59
		
Skladujte a přepr. při teplotě méně než -30 °C. Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte. Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160		

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku		
		
C20102200615270		B RhD NEG
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		ccee Cw- K- Jk(a-b+)
Množství: 235 g 229 ml 1 T.U.		Odebráno: 17.03.2022
Vyrobeno z aferézy Použit roztok NA-CITRAT Snížené riziko TRALI.		
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH	VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ	Použitelné do: 16.03.2025 23:59
		
Skladujte a přepr. při teplotě méně než -30 °C. Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte. Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160		

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102201319570		O	
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		RhD POZIT	
Množství: 206 g 201 ml 1 T.U.		CCee Cw- K-	
Vyrobeno z aferézy Použití roztok 4% CITRÁT Snižené riziko TRALI.		Odebráno: 14.06.2022 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 02.12.2022 15:25 	
VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ			
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102200764873		AB	
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		RhD POZIT	
Množství: 217 g 212 ml 1 T.U.		Ccee Cw- K-	
Vyrobeno z aferézy Použití roztok ACD-A Snižené riziko TRALI.		Odebráno: 06.04.2022 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 14.11.2022 18:49 	
VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ			
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku		
		
C20102200393570		AB RhD POZIT
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		CcEe Cw- K-
Množství: 207 g 202 ml 1 T.U.		Odebráno: 17.02.2022
Vyrobeno z aferézy Použití roztok ACD-A Snižené riziko TRALI.		
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 16.02.2025 23:59
		
Skladujte a přepr. při teplotě méně než -30 °C. Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte. Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160		

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku		
		
C20102200615270		B RhD NEG
PAR anti-CoV-2 Plazma z aferézy rekonvalescentní anti-SARS-CoV-2		ccee Cw- K- Jk(a-b+)
Množství: 235 g 229 ml 1 T.U.		Odebráno: 17.03.2022
Vyrobeno z aferézy Použití roztok NA-CITRAT Snižené riziko TRALI.		
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 16.03.2025 23:59
		
Skladujte a přepr. při teplotě méně než -30 °C. Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte. Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160		

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201021 023940⁵⁰

GA



GRANULOCYTY Z AFEREZY

Množství: 383 g 363 ml 1 TD

Vyrobeno z aferézy
Odebráno do 63 ml CPDHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

**AB** RhD POZIT

ccEE Cw- K-

Odebráno: 25.10.2021

Použitelné do:
26.10.2021 14:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201021 023940⁹⁰

GA



GRANULOCYTY Z AFEREZY

Množství: 383 g 363 ml 1 TD

Vyrobeno z aferézy
Odebráno do 63 ml CPDHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
OZÁŘENO.**AB** RhD POZIT

ccEE Cw- K-

Odebráno: 25.10.2021

Použitelné do:
26.10.2021 14:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022603616³⁰

G



GRANULOCYTY

Množství: 95 g 90 ml 0.5 TD

Vyrobeno z 5 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.



O

RhD POZIT

Odebráno: 17.08.2022

Použitelné do:
18.08.2022 13:08Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022605356⁹⁰

G



GRANULOCYTY

Množství: 112 g 107 ml 0.5 TD

Vyrobeno z 5 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
OZÁŘENO.

O

RhD POZIT

Odebráno: 22.11.2022

Použitelné do:
24.11.2022 08:22

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201017 000973⁹¹		A	
TADR TADR NUTNO NASTAVIT KÓD V ROZTOKU! TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM ROZTOKU Množství: 212 g 206 ml 1 TD Trombocyty > 200 x 10 na 9 Vyrobeno z aferézy Použití roztok ACDA Zpracováno ve 250 ml SSP+		RhD POZIT Ccee Cw- K-	
		Odebráno: 13.01.2017 	
		Použitelné do: 17.01.2017 10:59 	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG Snižené riziko TRALI. Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte. Promyto.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022 604671⁹⁰		A	
TBSDR TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ (V NAHRADNÍM ROZTOKU) Množství: 311 g 302 ml 1 TD Trombocyty > 200 x 10 na 9 Vyrobeno z 4 odběrů, Odebráno do 63 ml CPD Zpracováno ve 250 ml SSP+		RhD POZIT	
		Odebráno: 14.10.2022 	
		Použitelné do: 18.10.2022 13:59 	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG Snižené riziko TRALI. Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte. Promyto.			


C20102300033890

C20102300033890

C20102300033890

C20102300033890

C20102300033890

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO č. přípravku	
	
C20102300033890	A RhD POZIT A1 CCee Cw- K- Odebráno: 05.01.2023 Použitelné do: 23.01.2023 23:59
C20102300033890	
C20102300033890	
C20102300033890	
C20102300033890	
 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku



C201022400005

APK



AUTOLOGNÍ ODBĚR:
PLNÁ KREV

Množství: 472 g 449 ml 1 T.U.

Hematokrit > 0,33
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plné krve
Odebráno do 63 ml CPD

AUTOTRANSFUZE

Dárce/příjemce: 735314/4271
MIŠČÍKOVÁ MARIE

Vyhovuje v předepsaných testech
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.



A

RhD NEG

Odebráno: 23.03.2022



Použitelné do:

04.05.2022 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
C. přípravkuC201022400003²⁰

AERD

AUTOLOGNÍ ODBER:
ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 275 g 257 ml 1 T.U.

Vyrobeno AERD
Odebráno do 63 ml CPD**AUTOTRANSFUZE**

Dárce/příjemce: 735314/4271

MIŠČÍKOVÁ MARIE

Vyhovuje v předepsaných testech
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.**A**

RhD NEG

Odebráno: 16.03.2022



Použitelné do:

27.04.2022 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
C. přípravkuC201015400329²¹

AP

AUTOLOGNÍ ODBER:
PLAZMA

Množství: 226 g 220 ml T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD**AUTOTRANSFUZE**

Dárce/příjemce: 645420/0269

DOČKALOVÁ IRENA

Vyhovuje v předepsaných testech

Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.

Po rozmrazení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.

**O**

RhD POZIT

Odebráno: 07.07.2015



Použitelné do:

05.09.2015 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022001828¹⁰

P



PLAZMA

Množství: 266 g 259 ml 1 T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plné krve
Odebráno do 63 ml CPD

Skladujte a přepravujte při méně než -20 °C.

Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci

O

RhD POZIT

Odebráno: 24.01.2022

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022101726¹⁰

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 288 g 281 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok 4% CITRÁTSkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci**O**

RhD POZIT

Odebráno: 17.02.2022

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022100141¹⁰

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 591 g 576 ml 2 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok 4% CITRÁTSkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci**AB**

RhD POZIT

Odebráno: 05.01.2022

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022000049¹⁰**O**

RhD POZIT

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 795 g 775 ml 3 T.U.

Odebráno: 03.01.2022

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok 4% CITRÁTSkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaciTransfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022000034¹⁰**A**

RhD POZIT

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 865 g 843 ml 4 T.U.

Odebráno: 03.01.2022

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok 4% CITRÁTSkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201020000424¹⁰

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 243 g 237 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok ACD-ASkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci**O**

RhD POZIT

Odebráno: 08.01.2020

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201021000005¹⁰

PA



PLAZMA Z AFEREZY

Množství: 453 g 442 ml 2 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použit roztok ACD-ASkladujte a přepravujte při méně než -20 °C.
Human plasma for fractionation / Lidská plazma k frakcionaci**A**

RhD POZIT

Odebráno: 04.01.2021

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201022001830³⁰

BC



BUFFY-COAT

Množství: 65 g 62 ml 1 T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPDHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG**A**

RhD POZIT

CCee Cw+ K-

Odebráno: 24.01.2022



Použitelné do:

25.01.2022 23:59



PKZ

A+



C201022001830

24.01.2022

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku**C2010**

Množství:

gHematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Odebráno:

Použitelné do:

Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku**C2010****ERD****ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ**

Množství:

g 1 ksHematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Odebráno:

Použitelné do:

PEDIATRICKÁ JEDNOTKA. Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku**C2010****TADR****TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM
ROZTOKU**Množství: **g 1 TD**Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z aferezy
Použití roztok ACDA
Zpracováno ve 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
Třepejte.

Odebráno:

Použitelné do:

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku**C2010****TBSDR****TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMESNÉ DELEUKOTIZOVANÉ, V
NAHRADNÍM ROZTOKU**Množství: **g 1 TD**Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
Třepejte.

Odebráno:

Použitelné do: