

**Oddělení klinické biochemie - Monitorování terapeutických hladin (TDM) antibiotik**

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| NS:  | Datum: | Razítko (IČP):    |
| Telefon:   |        |                   |
| Č.P.:  |        |                   |
| Jméno:   |        |                   |
| Pojišťovna:  |        | Podpis lékaře:    |
| Dg. k indikaci ATB th.:  |        | Odbornost lékaře: |
| ATB th. podložena mikrobiologickým vyšetřením <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>Výběr ATB konzultován s OKMI <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE<br>Vyšetřovaný materiál: <input type="checkbox"/> krev <input type="checkbox"/> krev + likvor <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> krev + pankreatická šťáva<br>Odběrový systém (zkumavka): krev (plazma): K3EDTA, min. objem 2,7 ml<br>likvor / pankreatická šťáva: polypropylenová zkumavka bez příměsí |        |                   |

**NEZBYTNOU PODMÍNKOU VYŠETŘENÍ JE UVEDENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ A DÁVKOVÁNÍ**

| Antibiotikum           | název přípravku | datum odběru | čas odběru | odběr provedl/a | zahájení léčby (datum) |                      | denní dávka (mg) |  | čas posl. dávky | dávka (mg) | počet dávek/den |
|------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| Meropenem <sup>2</sup> |                 |              |            |                 |                        | Kontinuální podávání |                  | Intermitentní (nekontinuální) podávání |                 |            |                 |
| Piperacilin            |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Cefepim                |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Linezolid              |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Daptomycin             |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Ampicilin              |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Cefazolin              |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Cefotaxim              |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |
| Chloramfenikol         |                 |              |            |                 |                        |                      |                  |  |                 |            |                 |

**Poznámky:**
<sup>1</sup> Společně se stanovením hladiny ATB bude vyšetřena i HEB.

<sup>2</sup> Z důvodu stability odeslat vzorek na ÚLM-OKB bezprostředně po odběru.

**Současně podávaná medikace - zaškrtněte:**

1) nefrotoxická medikace - specifikujte:

- vankomycin, aminoglykosidy, kolistin, furosemid, ACEi, NSAIDs, cyklosporin, methotrexát, cidofovir, foskarnet, acyclovir a deriváty
- kontrastní látky:
- cytostatika konkrétně:
- jiné:

2) medikace s významným interakčním potenciálem pro meropenem: valproát

- ANO
- NE

Speciální podmínky odběru viz Laboratorní příručka ÚLM-OKB