



Rezistence v mužském prsu

Monika Poláčková


LFMU a FN Brno

přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA


Naše zkušenosti

- V období 01/2011 – 05/2014 bylo vyšetřeno 92 mužů ve věkovém rozmezí 12 až 88 let.

indikace k UZ prsu







statistika UZ nálezů





1. Kazuistika


66let

- Tři týdny rezistence za bradavkou
- Zvětšující se, mírně bolestivá,
- Pohyblivá oproti spodině
- Bradavka vpáčená
- Bez známek zánětu






GYNEKOMASTIE





2. Kazuistika



49let

- Asi 10let hmatná rezistence nad dvorcem
- Občas bolestivá
- Bez známek zánětu, pohyblivá
- Neví, zda se zvětšuje











LIPOM






3.Kazuistika




59let

- Asi 14dnů hmatná rezistence na rozhraní zevních kvadrantů kraniálně od dvorce
- Pohyblivá proti spodině
- Nebolestivá






PAPILOKARCINOM





4. Kazuistika

59let

- Půl roku hmatná rezistence excentricky směrem do horního zevního kvadrantu
- Nebolestivá, pohyblivá
- Bez známek zánětu, bez sekrece








INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOM

5. Kazuistika



60let

- Od 10/2011 akutní myeloidní leukémie
- Adenokarcinom prostaty
- 08/2012 – alotransplantace kmenových buněk
- 11/12 – 3měsíce od ukončení terapie týden bolestivost pravého prsu
- Bez teplot, zvětšující se prs, mírně zarudlý









**EXTRAMEDULÁRNÍ RELAPS AML,
LEUKEMICKÁ INFILTRACE BILAT.**




6. Kazuistika



42let

- Hmatná rezistence za dvorcem
- Bez sekrece, bez známek zánětu
- Pohyblivá
- Nebolestivá







INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOM




závěr:

GYNEKOMASTIE VS. KARCINOM


gynekomastie	karcinom
- Subareolárně - Bolest - Oboustranně - Bez vaskularizace	- Excentricky - Nebolestivost - Jednostranně - Vaskularizace



KVÍZ




**BOLESTIVOST V OBOU PRSECH
PRSA LEHCE ZVĚTŠENÁ**




**V ZEVNÍM HORNÍM KVADRANTU
NEBOLESTIVÁ REZISTENCE
POHYBLIVÁ**

KVÍZ




GYNEKOMASTIE



LIPOM

PO EXSTIRPACI



Take home message

- Anamnéza (fyziolog.zvýšení estrogenů, cirhóza, tumory varlat, Th karcinomu prostaty, rodina, jiné léky – diuretika, antidepressiva)
- Klinické vyšetření (známky zánětu, pohyblivost, lokalizace)
 - **UZ**
 - Při nejasném nálezu – MG, biopsie
- Gynekomastie - kontrola za 2-3měsíce, doplnit anamnézu

- **Děkuji za pozornost**