

Příloha k informovanému souhlasu s plánovaným výkonem

Uretrocystografie

V rámci snahy o Vaši dokonalou informovanost o Vašem zdravotním stavu nabízíme doplňující písemný materiál, ve kterém se snažíme podat co nejvíce informací o plánovaném léčebném postupu. Základní informace Vám byla podána ošetřujícím lékařem ať již v ambulantním traktu či na lůžkovém oddělení kliniky. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o spoustu nových a svým obsahem velmi závažných sdělení, které jistě při prvním ústním sdělení všechny nemůžete v plném rozsahu vstřebat a adekvátně zhodnotit.

Vážený paciente,

na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno provedení uretrocystografie.

Co je uretrocystografie:

Uretrocystografie je zobrazovací rentgenové vyšetření močové trubice a močového měchýře pomocí kontrastní látky.

Jaký je důvod (indikace) k výkonu:

1. Diagnostika průchodnosti a celistvosti močové trubice: striktura (zúženina) nebo trauma (poranění) močové trubice
2. Diagnostika patologie močového měchýře: nádory, kameny, divertikly, cizí tělesa
3. Diagnostika vesikoureterálního refluxu

Alternativní výkony:

Endoskopický výkon uretrocystoskopie (prohlédnutí močové trubice a močového měchýře). Vyšetření však nejsou rovnocenné, spíše se navzájem doplňují.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Vyšetření lze provádět ambulantně. Není nutné žádné specifické režimové opatření. Před samotným vyšetřením je vhodné se vymočit, aby byl močový měchýř prázdný.

Jaký je postup výkonu:

V lokální anestezii Mesocain gelem se do močové trubice se zavede tenký katetr (cévka), přes který se močová trubice a močový měchýř plní kontrastní látkou. Již během této plnění fáze se provádějí RTG snímky. Plnění probíhá do momentu, kdy pacient udává pocit plného močového měchýře nebo nucení na močení. Následně se katetr extrahuje (vytáhne) a pacient se vymočí. I během této mikční fáze se provádějí RTG snímky v různých projekcích.

Možné komplikace:

- krvácení z močové trubice
- infekce (zánět) močových cest
- zástava močení po naplnění močového měchýře s nutností zavedení a ponechání močového katetru
- alergická reakce na kontrastní látku (může se projevit jako vyrážka, nevolnost, dechové potíže nebo anafylaktická reakce a šok)
- únik kontrastní látky mimo lumen močové trubice do okolních žilních či lymfatických pletení nebo topořivých těles penisu

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Dostatečný příjem tekutin a pravidelné močení jako prevence vzniku infekce (zánětu).

Možná omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení uretrocystografie:

Uretrocystografie se provádí ambulantně. Není nutné vystavení práceneschopnosti. Pacient je po provedení schopen obvyklého způsobu života.

Poskytnutí dalších zdravotních služeb a doporučení:

Po provedení uretrocystografie bude pacient pozván na ambulantní kontrolu, kde urolog zhodnotí výsledek vyšetření.

Riziko spojené s RTG (ionizujícím) zářením:

Rádiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Jejich snahou je postupovat tak, aby výsledek vyšetření byl co nejkvalitnější při co nejmenší možné expozici (vystavení) pacienta ionizujícímu záření. RTG přístroje musí splňovat příslušné normy a jejich stav je pravidelně kontrolován. K ochraně lidského zdraví patří i používání ochranných prostředků při práci s RTG. Expoziční dávky RTG jsou sledovány a zaznamenávány.