

Příloha k informovanému souhlasu

s plánovaným výkonem

Frenuloplastika

V rámci snahy o Vaši dokonalou informovanost o Vašem zdravotním stavu nabízíme doplňující písemný materiál, ve kterém se snažíme podat co nejvíce informací o plánovaném léčebném postupu. Základní informace Vám byla podána ošetřujícím lékařem ať již v ambulantním traktu či na lůžkovém oddělení kliniky. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o spoustu nových a svým obsahem velmi závažných sdělení, které jistě při prvním ústním sdělení všechny nemůžete v plném rozsahu vstřebat a adekvátně zhodnotit.

Vážený paciente,

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno provedení frenuloplastiky.

Co je frenuloplastika a jaký je důvod (indikace) k výkonu:

Frenuloplastika je operační výkon, při kterém se prodlužuje uzdička spojující předkožku se žaludem penisu. Tato operace se provádí z estetických a funkčních důvodů, nebo pro nemožnost přetažení či obtížné přetahování předkožky.

Alternativní výkony:

Adekvátní alternativa léčby neexistuje.

Jaký je postup výkonu:

Operace se provádí v lokální anestézii a trvá asi 20 minut. Spočívá v naříznutí části uzdičky a jejím následném sešití jemnými stehy, které se sami vstřebávají a vypadnou při koupání rány v heřmánku

Následky a možná rizika:

Po výkonu může dojít k otoku v oblasti rány, otok je však spíše následek operace než samotná komplikace, jedná se o reakci tkáně na výkon a postupně odezní.

Časně po operaci může dojít vzácně ke krvácení, které je většinou pouze minimální a spontánně odezní, pokud by bylo krvácení výraznější, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Časnou, ne však častou komplikací může být infekce v oblasti operační rány projevující se otokem, zarudnutím a případně hnisavým výtokem z oblasti operační rány. Další komplikací může být pooperační hematoma zejména v okolí ranné plochy eventuálně přestupující i na celý penis, tento hematoma se postupně vstřebá spontánně. Z pozdních komplikací se může vyskytnout kosmeticky nevyhovující vystouplá jizva (keloidní jizva).

Možná omezení po výkonu a pracovní neschopnost:

Po výkonu je vhodný klidový režim, který je vhodné dodržovat 1-2 dny. Individuálně dlouho může přetrvávat nepříjemný pocit při zvýšeném tření žaludu o spodní prádlo. Délka pracovní neschopnosti závisí na typu profese, pokud vykonáváte kancelářskou práci a nenosíte těžká břemena, pak není ovlivněna pracovní schopnost, pokud vykonáváte těžkou fyzickou práci, tak je vhodné prvních 5 dnů spíše klidovější režim. Samotná schopnost vykonávat práci není ovlivněna, ale může dojít při namáhání k uvolnění stehů.

Změny zdravotní způsobilosti či trvalá omezení:

Beze změn ve zdravotní způsobilosti či trvalých omezení.

Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních:

Po výkonu je nutná kontrola za 2-3 hodiny na naší ambulanci, další kontrola cca za 1 měsíc od výkonu. Po odstranění krycího obvazu jsou nutné koupele penisu v heřmánku. Nutná je pohlavní abstinence do zhojení rány. Dále není vhodné koupání ve vaně, do zhojení rány je třeba se pouze sprchovat. Je zakázáno koupání v bazénu či rybníku z důvodu rizika zanesení infekce.