

Zkrácená informace o přípravku Cialis **Název přípravku:** CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. **Léčivá látka:** Tadalafil 5 mg v tabletě **Indikace:** Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafilu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. **Dávkování a způsob podání:** Erektální dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku. Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na tadalafil nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s pre-existujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu u uplynulých 90ti dních nebo nestabilní angina pectoris, anginózní bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypotenze (<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda u uplynulých 6ti měsíců, ztráta zraku na jednom oku z důvodu NAION. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem by měl být vyšetřím vyločen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav. **Interakce:** U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzivní terapie. U pacientů užívajících alfa1 blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzii. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba přípisem zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku přípisu. Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafilu se nedoporučuje. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. **Těhotenství a kojení:** CIALIS není indikován k použití u žen. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích účinků. **Doba použitelnosti, skladování:** 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. **Balení:** Blistr v papírové skřínce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. **Registrační číslo:** EU/1/02/237/007-008 **Datum revize textu:** 13.2.2013. **Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly:** <https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois> nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12/394, 18600 Praha 8, tel. 234 664 111, fax: 234 664 891. Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni 13.2.2013.

Aktuální otázky nejen z urologie

Přístup k léčbě urologického pacienta z pohledu nejen urologického

10. 6. 2014 od 16:30 hod.

Hotel Santander
Pisárecká 6, 603 00 Brno



Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

společnost ELI LILLY ve spolupráci s Českou urologickou společností a Českou lékařskou komorou si Vás dovoluji srdečně pozvat na seminář **Aktuální otázky nejen z urologie - přístup k léčbě urologického pacienta z pohledu nejen urologického.**

Naši přední odborníci Vám formou interaktivních přednášek představí nové a zajímavé vědecké poznatky nejen ze světa urologie.

Vzdělávací akce je podle stavovského předpisu ČLK č. 16 hodnocena 3 kredity.

Přihlásit se můžete na adrese: www.creanto.cz/seminare2014brno/ nebo přes svého obchodního zástupce.

Těšíme se na setkání s Vámi.

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Odborný garant.
Fakultní nemocnice Brno

Ing. Barbora Kadlecová

Jr. Brand Manager Cialis, ČR/SR
ELI LILLY ČR, s.r.o.

Odborný program:

- | | |
|---------------|---|
| 16:30 | Registrace |
| 16:55 – 17:00 | Zahájení semináře
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. |
| 17:00 – 17:30 | Přístup k diagnostice a terapii pacientů s ED a somatickými komorbiditami
MUDr. Taťána Šrámková, CSc. |
| 17:30 – 18:00 | Zkušenosti a postupy v léčbě urologických pacientů s ED a BPH-LUTS
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. |
| 18:00 – 18:15 | Přestávka |
| 18:15 – 19:15 | Placebo - podvod nebo užitečný nástroj
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. |
| 19:15 – 19:30 | Diskuze |
| 19:30– 19:35 | Ukončení semináře
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. |
| 19:35 | Večeře |

Lilly