



**FAKULTNÍ  
NEMOCNICE  
BRNO**



PRAKTICKÝ PRŮVODCE

# **PŘÍPRAVA STŘEVA PŘED KOLONOSKOPIÍ**





**FAKULTNÍ  
NEMOCNICE  
BRNO**

Jihlavská 20, 625 00 Brno – Bohunice  
+420 532 233 810  
[www.fnbrno.cz/endoskopicke-centrum/k1446](http://www.fnbrno.cz/endoskopicke-centrum/k1446)



## OBSAH

---

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Co je to kolonoskopie?</b>               | <b>4</b>  |
| <b>Mám se kolonoskopie bát?</b>             | <b>5</b>  |
| Co si vezmu sebou na vyšetření?             | 7         |
| Máte vyšetření objednané s ARO asistencí?   | 7         |
| <b>Jak se dobře připravím na vyšetření?</b> | <b>8</b>  |
| 7 dní před vyšetřením                       | 8         |
| Nevhodné a vhodné potraviny                 | 8         |
| Den před vyšetřením                         | 9         |
| <b>Vyprazdňovací roztoky</b>                | <b>10</b> |
| CitraFleet                                  | 12        |
| Clensia                                     | 13        |
| Eziclen                                     | 14        |
| Fortrans                                    | 15        |
| Moviprep                                    | 16        |
| Picoprep                                    | 17        |
| Plenvu                                      | 18        |
| <b>Slova na závěr</b>                       | <b>19</b> |





## CO JE TO KOLONOSKOPIE?

---

Jedná se o bezpečnou endoskopickou metodu, která pomocí tenkého ohebného přístroje s kamerou umožní vyšetření konečníku, tlustého střeva a eventuálně konečné části tenkého střeva. Pro stejné vyšetření se používá i termín koloskopie.

Výhodou vyšetření je přímé prohlédnutí stavu střevní sliznice, možnost odběru vzorků k histologickému rozboru, popřípadě okamžité léčebné řešení a odstranění slizničních výrůstků – polypů. Aby bylo možné střevo prohlédnout, je nutná před vyšetřením příprava – očista od střevního obsahu.

Tato spolehlivá vyšetřovací metoda významně napomáhá odhalovat závažná střevní onemocnění v počátečních stádiích, což má zásadní vliv na průběh a úspěch léčby. Odstranění tzv. adenomových polypů snižuje riziko rozvoje nádoru.

K dispozici je moderní přístrojové vybavení obsluhované proškoleným týmem špičkových lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků.

**Účelem průvodce,** který držíte v ruce, je poskytnout Vám všeobecné informace ke správné přípravě před kolonoskopickým vyšetřením.

Najdete zde soubor doporučení, poznatků a zkušeností zdravotnických pracovníků, kteří Vám chtějí pomoci překonat Vaše obavy z přípravy a samotné kolonoskopie.

Váš odborný tým lékařů a sester Endoskopického centra a Interní gastroenterologické kliniky FN Brno





## MÁM SE KOLOSKOPIE BÁT?

---

Vyšetření je vnímáno velice individuálně a není rozhodně třeba se jej obávat. Doba provedení se může pohybovat od 15 do 60 min. Mezi faktory, které ovlivňují délku vyšetření, patří anatomické uspořádání střeva, prodělané břišní operace, dobrá kvalita vyprázdnění, Vaše spolupráce a rozsah úkonů, které během kolonoskopie je potřeba provést.

Aby bylo možné střevo prohlédnout, dochází během vyšetření k plnění střeva vzduchem, vodou, nebo oxidem uhličitým. To může někdy vyvolat nepříjemný tlak, pocity plnatosti nebo křeče v břiše, které lze zmírnit pomalým dýcháním, uvolněním břišních svalů a spontánním odchodem plynů bez zbytečného ostychu.

Ve většině případů, pokud si sami neurčíte jinak, podáváme před nebo v průběhu výkonu tlumící léky, které Vám pomohou zvládnout kolonoskopii bez nepříjemných pocitů a zážitků.

Ve zvláštních případech, lze výkon též provést v tzv. hluboké analgosedaci za asistence anesteziologického týmu. Tuto možnost však musíte konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a vyžaduje speciální přípravu a objednání.

Po vyšetření následuje období odpočinku na našem stacionáři, jehož délka je závislá na podání výše uvedených léků a vašem zdravotním stavu, obvykle v rozsahu od 1 do 4 hodin.

Vzhledem k uvedenému je nutné, abyste si zajistili doprovod na cestu domů.

Při podání tlumících léků není možné po dobu minimálně 8 hodin řídit motorové vozidlo.





Po vyšetření doporučujeme spíše klidový režim. Po zbytek dne můžete mít mírné křeče a bolesti břicha, pocity plynatosti, které však budou postupně odcházet.

Po realizovaném vyšetření bez větší intervence je obvykle možné zahájit příjem tekutin a jídla po odeznění medikace. Doporučujeme, abyste první den nekonsumovali nadýmavé, pikantní a tučné jídlo. V případě terapeutických výkonů, což je nejčastěji odstraňování polypů, je režim po výkonu doporučen individuálně, dle pokynů lékaře.





## **DOKUMENTACE POTŘEBNÁ K VYŠETŘENÍ:**

Vezměte si sebou na vyšetření následující dokumenty.

### **MÁTE OBJEDNANÉ BĚŽNÉ VYŠETŘENÍ?**

- ▶ Žádanku od odesílajícího lékaře
- ▶ Kartičku pojišťovny
- ▶ Vytištěné výsledky krevních testů, pokud je váš lékař doporučil (krevní obraz + koagulace)
- ▶ Informovaný souhlas ke kolonoskopii vydaný při objednávání (je dostupný též na webových stránkách)

Odkaz: [www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/endoskopickecentrum/informovane-souhlasy-gastroenterologie/t5173](http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/endoskopickecentrum/informovane-souhlasy-gastroenterologie/t5173)

### **MÁTE OBJEDNANÉ VYŠETŘENÍ S ASISTENCÍ ANESTEZIOLOGA?**

- ▶ Žádanku od odesílajícího lékaře
- ▶ Kartičku pojišťovny
- ▶ Předoperační interní vyšetření, včetně potřebných krevních testů, EKG křivka
- ▶ Informovaný souhlas ke kolonoskopii vydaný při objednávání (je dostupný též na webových stránkách)

Odkaz: [www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/endoskopickecentrum/informovane-souhlasy-gastroenterologie/t5173](http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/endoskopickecentrum/informovane-souhlasy-gastroenterologie/t5173)





## JAK SE DOBŘE PŘIPRAVIT NA VYŠETŘENÍ?

Kvalitní příprava tlustého střeva je pro kolonoskopii klíčová. Pro správné vyčištění střeva je nutné dodržet stanovený postup. Ten spočívá ve správném dietním režimu a užití vyprazdňovacího roztoku.

► Je-li dle typu vyšetření potřebné, zajistěte ve spolupráci s odesílajícím nebo praktickým lékařem aktuální odběry krve či vyšetření potřebné pro anesteziologa.

### 7 DNÍ PŘED VYŠETŘENÍM:

- Vysaďte léky obsahující železo (Ferronat, Aktiferin, Sorbifer...)
- Dle pokynů odesílajícího lékaře může být potřebné upravit i jinou medikaci včetně léků na ředění krve a cukrovky.
- Vždy závisí na důvodu pro užívání konkrétního léku a charakteru plánovaného výkonu. Pro běžnou (diagnostickou) kolonoskopii není protisrážlivá léčba překážkou.

( Úpravu medikace vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. )

Je nutné nasadit BEZEZBYTKOVOU DIETU

Potraviny nesmějí obsahovat dlouhodobě nestrávitelné zbytky, které mohou zůstat ve střevě i několik dní po konzumaci.

#### Nevhodné potraviny:

Tuhé vláknité maso, klobásy, sušené ovoce, ořechy, kokos, mák, brambory se slupkou, zelenina a ovoce se slupkou a – zrníčky, luštěniny, rýže, celozrné těstoviny a pečivo, džem skousky ovoce, cereálie, ovesná kaše, otruby, jogurty s kousky ovoce a vloček, turecká káva

#### Vhodné potraviny:

Měkké libové maso, jogurty bez kousků ovoce, brambory bez slupky, uvařená zelenina bez slupek, měkké ovoce (banán), bujón, bílé pečivo, želírovaný džem, čaj, instantní káva, cukr, šťávy bez dužiny, minerálky, voda...





## **JSTE DIABETIK, MÁTE CHRONICKÉ ONEMOCĚNÍ LEDVIN**

Postup správné přípravy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Může být potřebné upravit užívané léky nebo příjem tekutin.

## **MÁTE STOMII**

Vezměte si sebou náhradní stomické pomůcky. Způsob přípravy konzultuje se svým ošetřujícím lékařem.

## **DEN PŘED VYŠETŘENÍM:**

- ▶ **Snídaně:** Instantní káva bez mléka nebo čaj, bílé nesypané pečivo (rohlík, piškot) apod. (1 ks)
- ▶ **Oběd:** Pouze čirý vývar nebo bujón (bez masa, zeleniny a těstovin)

**Vyvarujte  
se alkoholu!!!**

## **Po celý den výrazně zvyšte svůj obvyklý příjem tekutin.**

S přípravou a popíjením roztoku začněte v odpoledních nebo večerních hodinách, dle termínu plánovaného výkonu.

**Celkový objem přijatých tekutin  
musí být minimálně 4 litry!!!**

## **V DEN VYŠETŘENÍ:**

- ▶ Nejezte nic, ranní dávku léků (např. na léčbu krevního tlaku) si vezměte jako obvykle. Seznam aktuálně užívaných léků si vezměte s sebou.
- ▶ Tekutiny můžete přijímat bez omezení, i navíc k vyprazdňovacímu roztoku. Nepijte již cca 3 hodiny před vyšetřením. Výjimkou je vyšetření v analgosedaci vedené anesteziologem. Zde nepijte nic ani vyprazdňovací roztok již 5 hodin před plánovaným časem vyšetření.





## VYPRAZDŇOVACÍ ROZTOKY:

---

V dnešní době je na trhu několik druhů kvalitních vyprazdňovacích přípravků. Jejich správná volba závisí na domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem, který dle zdravotního stavu určí pro Vás nejvhodnější formu vyprazdňování. Podání očistných roztoků způsobí průjem, dostatečné množství přijaté tekutiny zlepší odstranění i drobných zbytků střevního obsahu.


Pro úspěšně provedenou koloskopii je nezbytné dodržet přesný postup při popíjení roztoku a správné množství přijatých tekutin.

Lepší očisty střeva je dosaženo při rozdělení přípravy a pití druhé části vyprazdňovacího roztoku relativně blízko času vyšetření, tak aby bylo ukončeno cca 3-4 hodiny před výkonem.

Ke zlepšení tolerance roztoku je možné ho vychladit nebo popíjet brčkem.

Vhodné je tedy rozdělení přípravy (3+1 nebo 2+2 litry u přípravků s větším objemem, 1+1 dávka u ostatních přípravků) na večer den před vyšetření a ráno v den vyšetření (a to i v případě, že budete muset vstávat časně). Pokud je kolonoskopie naplánována v odpoledních hodinách, je možné podání obou dávek v den vyšetření. Podání celé přípravy den před vyšetřením je vhodné jen při časném ranním termínu výkonu nebo nemožnosti dostatečného odstupu při plánované analgosedaci s anesteziologem.



**Kvalitní příprava:**

Střevo je čisté  
Příprava a vyšetření se nemusí  
opakovat  
Lékař vidí vše (polypy)

**Nekvalitní příprava:**

Střevo není čisté  
Doba koloskopie delší  
Příprava a vyšetření se musí  
brzy opakovat

Na následujících stranách Vám představíme jednotlivé roztoky, jejich přípravu a správné užití.





## CITRAFLEET

Balení obsahuje 2 sáčky (A, B).

Každý sáček ředíme ve 150 ml vody nebo čirého nápoje. Pokud se roztok zahřeje, nechte jej vychladnout.

Ke každému sáčku musíte vypít minimálně 2l čirých tekutin, ideálně během 2 následujících hodin.

Celkový objem přijatých tekutin během očistného procesu musí být minimálně 4 litry.

Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je nutné dodržet odstup nejméně 4-5 hodin



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Prvních 150ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 16 hodin. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v cca 21 hodin.                                                                                     |
| 8.30 – 13.00h: | Prvních 150 ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 20 hodin den před vyšetřením. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v den vyšetření cca v 5-8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem). |
| 13.00 a více:  | Prvních 150 ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 5 hodin v den vyšetření. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v den vyšetření v cca 9 hodin ráno.                                                 |





## CLENSIA

Balení obsahuje 8 sáčků (4x sáček A - velký, 4x sáček B - malý). Do 1l vody naředíme vždy 2 sáčky A a 2 sáčky B. Kromě užití přípravy je třeba vypít navíc celkem nejméně 0,5 - 1 litr "průhledné" tekutiny.

Druhou dávku připravte stejným způsobem a opět je třeba vypít 0,5 - 1 litr tekutiny navíc.

Celkový objem přijatých tekutin během očistného procesu musí být minimálně 3, lépe 4 litry.

Frekvence pití roztoku by měla být 1 litr/1 - 2 hodiny.

Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je nutné dodržet odstup nejméně 1-2 hodiny



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Obě dávky vypijte večer před vyšetřením. První dávku - 1 litr roztoku a min. 0,5 - 1 litr dalších tekutin vypít večer v cca 17 hodin, během 1 - 2 hodin. Po krátké přestávce pokračujte v cca 20 hodin druhou dávkou.                                           |
| 8.30 – 13.00h: | První dávka - 1 litr roztoku a min. 0,5 - 1 litr dalších tekutin vypít večer v cca 20 hodin, během 1 - 2 hodin. Druhou dávku 1 litr roztoku a min 0,5 - 1 litr dalších tekutin vypít v den vyšetření v 5-8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem). |
| 13.00 a více:  | Obě dávky vypijte v den vyšetření. První dávku - 1 litr roztoku a min. 0,5 - 1 litr dalších tekutin vypít v 5 hodin ráno, během 1 - 2 hodin. Po krátké přestávce pokračujte v cca 8 - 9 hodin druhou dávkou.                                                    |





## EZICLEN

Balení obsahuje 2 lahvičky. Každou lahvičku naředíte do celkového objemu 500 ml s vodou nebo čirým nápojem v přiložené odměrce a vypijte v průběhu 1 hodiny.

Ke každé naředěné lahvičce musíte vypít minimálně 1 - 1,5 litru čirých tekutin. Celkový objem přijatých tekutin během očištného procesu musí být minimálně 4 litry. Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je možné navázat ihned podáním druhé dávky.



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Obě dávky vypijte večer před vyšetřením. první dávku vypít večer v cca 18 hodin, během 1 - 2 hodin i s doprovodnou tekutinou. Po krátké přestávce pokračujte v cca 20 hodin druhou dávkou. |
| 8.30 – 13.00h: | První dávku vypít večer v cca 20 hodin, během 1 - 2 hodin. Druhou dávku vypít v den vyšetření v 5 - 8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem)                                  |
| 13.00 a více:  | Obě dávky vypijte v den vyšetření. První dávku vypít v cca 6 hodin ráno, během 1 - 2 hodin. Po krátké přestávce pokračujte v cca 8 hodin druhou dávkou.                                    |






## FORTTRANS

Balení obsahuje 4 sáčky. Každý sáček ředíme v 1 litru vody nebo čirého nápoje (celkem 4 litry). Lze jej ochutit sirupem, citronem a vychladit. Po celý den můžete navíc vypít libovolné množství čirých tekutin. Pít čiré tekutiny můžete do 3 hodin před výkonem. Frekvence pití roztoku by měla být cca 1 litr / 1 hodina.

Je-li Vaše hmotnost větší než 90 kg, může být zapotřebí ještě větší objem.



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Vypijte všechny 4 litry roztoku večer před vyšetřením. Začněte v cca 17 hodin.                                                                                                                                                                                |
| 8.30 – 13.00h: | Vypijte 2 litry roztoku den před vyšetřením. Začněte v cca 17 hodin a 2 litry roztoku dopijte v den vyšetření v 5 - 8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem). Při dřívějším času vyšetření lze upravit rozdělení na 3 litry večer a 1 litr ráno. |
| 13.00 a více:  | Vypijte 4 litry v den vyšetření se zahájením v cca 5 hodin ráno, vhodné dokončit přípravu minimálně 4 hodiny před plánovaným časem vyšetření. Individuálně je možné upravit rozdělení na 1 litr večer a 3 litry ráno.                                         |





## MOVIPREP

Balení obsahuje 2x2 obaly (sáček A, sáček B).

Obsah sáčku A a B rozpustíte v 1 litru vody a vypijte přibližně v průběhu 1 - 2 hodin. Druhou dávku připravte obdobným způsobem.

Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je možné navázat ihned podáním druhé dávky.

Po celý den musíte vypít minimálně 4 litry tekutin (2 litry roztoku + min. 2 litry dalších čirých tekutin).



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Obě dávky vypijte večer před vyšetřením. První dávku - 1 litr roztoku a min. 1 litr dalších tekutin vypít večer v cca 17 hodin, během 1 - 2 hodin. Po krátké přestávce pokračujte v cca 20 hodin druhou dávkou.                    |
| 8.30 – 13.00h: | První dávka - 1 litr roztoku a min. 1 litr dalších tekutin vypít večer v cca 20 hodin. Druhou dávku 1 litr roztoku a min 1 litr dalších tekutin vypít v den vyšetření v 5 - 8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem). |
| 13.00 a více:  | Obě dávky vypijte v den vyšetření. První dávku - 1 litr roztoku a min. 1 litr dalších tekutin vypít v 5 hodin ráno, během 1 - 2 hodin. Pokračujte v cca 8 hodin druhou dávkou, dopít nejméně 4 hodiny před plánovaným časem.       |





## PICOPREP

Balení obsahuje 2 sáčky.

Každý sáček ředíme ve 150 ml vody nebo čirého nápoje. Pokud se roztok zahřeje, nechte jej vychladnout.

Ke každému sáčku musíte vypít minimálně 1,5 - 2 litry čirých tekutin, ideálně během 2 následujících hodin.

Celkový objem přijatých tekutin během očistného procesu musí být minimálně 4 litry.

Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je nutné dodržet odstup nejméně 4 - 5 hodin.



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | Prvních 150 ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 16 hodin. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v cca 21 hodin.                                                                                |
| 8.30 – 13.00h: | Prvních 150 ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 20 hodin den před vyšetřením. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v den vyšetření cca v 5 - 8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před vyšetřením). |
| 13.00 a více:  | Prvních 150 ml roztoku a min. 2 litry dalších tekutin vypijte v cca 5 hodin v den vyšetření. Dalšíh 150 ml roztoku a 2 litry jiných tekutin vypijte v den vyšetření v cca 9 hodin ráno.                                             |





## PLENVU


Balení obsahuje 3 sáčky. První dávka je balena v jednom sáčku.

Druhá dávka ve dvou sáčcích A+B.

Obsah sáčku pro 1. dávku rozpusťte v 500 ml vody a vypijte přibližně v průběhu 30 - 60 minut, k tomu minimálně dalších 500 ml čiré tekutiny. Druhou dávku připravte rozpuštěním sáčku A a B a vypijte v průběhu 30 - 60 minut, optimálně ráno před vyšetřením, opět s minimálně dalšími 500 ml čiré tekutiny.

Musíte-li užít obě dávky ve stejný den, je nutné dodržet odstup 1 - 2 hodiny.

Kromě užití přípravy je třeba vypít navíc celkem nejméně 1 litr „průhledné“ tekutiny



### DĚLENÁ PŘÍPRAVA:

Důležité je správné načasování dle hodiny vyšetření.

#### ČAS VYŠETŘENÍ:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 – 8.30h:  | První dávku 500 ml a dalších minimálně 0,5 - 1 litr tekutin vypijte v cca 17 hodin. Druhou dávku 500 ml a 0,5 - 1 litr jiných tekutin vypijte v cca 20 hodin.                                                                                              |
| 8.30 – 13.00h: | První dávku 500 ml a dalších minimálně 0,5 - 1 litr tekutin vypijte v cca 20 hodin den před vyšetřením. Druhou dávku 500 ml a 0,5 - 1 litr jiných tekutin vypijte v den vyšetření cca v 5 - 8 hodin ráno (nejméně 4 hodiny před plánovaným časem).         |
| 13.00 a více:  | První dávku 500 ml a dalších minimálně 0,5 - 1 litr tekutin vypijte v cca 5 hodin den vyšetření. Po krátké přestávce cca 1 hodina, pokračujte druhou dávkou 500 ml a dalších minimálně 0,5 - 1 litr tekutin. Dopít nejméně 4 hodiny před plánovaným časem. |





## SLOVA NA ZÁVĚR:

---

Kolonoskopické vyšetření se v současnosti provádí pomocí nejmodernější endoskopické techniky, která zobrazuje sliznici tlustého střeva do všech detailů. Vyšetření je tak dokonalé, jak správně je vyprázdněné střevo. Kvalitní příprava je tedy důležitým předpokladem pro výsledek vyšetření, protože přehlédnutý patologický nález by mohl mít fatální následky.

Vždy se poraďte se svým lékařem, jak postupovat a co je pro Vás vhodné. Další informace můžete získat na našem pracovišti. Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám pochopit správný postup při přípravě ke kolonoskopii.

Po celou dobu Vašeho vyšetření, Vám bude k dispozici náš odborný personál, který Vás provede celým procesem a v rámci svých možností Vám s maximální ochotou a vstřícností odpoví na dotazy, které budete mít.





PRAKTICKÝ PRŮVODCE  
**PŘÍPRAVA STŘEVA  
PŘED KOLONOSKOPIÍ**

[www.fnbrno.cz/endoskopicke-centrum/k1446](http://www.fnbrno.cz/endoskopicke-centrum/k1446)

