

Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS)

Skóre	Hodnocení	Popis	
+4	Bojovný/á	Zjevně bojovný, násilný, ohrožuje bezprostředně personál	Pohledem
+3	Velmi agitovaný/á	Tahá nebo odstraňuje hadice nebo katétry, agresivní	
+2	Agitovaný/á	Četné neúčelné pohyby, neshoda s ventilátorem	
+1	Neklidný/á	Úzkostný, ale pohyby nejsou prudké nebo agresivní	
0	Bdělý/á a klidný/á	Spontánní pozornost vůči pečovateli	
-1	Ospalý/á	Není plně bdělý/á, ale po oslovení udrží bdělost (otevření očí, oční kontakt) 10 a více vteřin	Slovní podnět
-2	Lehká sedace	Po oslovení se krátce probudí, ale oční kontakt udrží méně než 10 vteřin	
-3	Střední sedace	Po oslovení otevře oči či reaguje pohybem, ale nenaváže oční kontakt	
Pokud je RASS \geq -3 (-3 až +4), pokračujeme 2. krokem (ps/pCAM-ICU)			
-4	Hluboká sedace	Nereaguje na hlas, ale na fyzický podnět otevře oči či zareaguje pohybem	Fyzický podnět
-5	Neprobuditelný/á	Bez reakce na oslovení či fyzický podnět	
Pokud je RASS -4 nebo -5, je nutné vyšetření ukončit a opakovat později.			