
Příloha k informovanému souhlasu s plánovaným výkonem

Ultrazvukové vyšetření transvaginální a introitální

V rámci snahy o Vaši dokonalou informovanost o Vašem zdravotním stavu nabízíme doplňující písemný materiál, ve kterém se snažíme podat co nejvíce informací o plánovaném léčebném postupu. Základní informace Vám byla podána ošetřujícím lékařem ať již v ambulantním traktu či na lůžkovém oddělení kliniky. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o spoustu nových a svým obsahem velmi závažných sdělení, které jistě při prvním ústním sdělení všechny nemůžete v plném rozsahu vstřebat a adekvátně zhodnotit.

Vážená paní,

na základě Vašich předchozích vyšetření bylo u Vás indikováno transvaginální ultrazvukové vyšetření (vyšetření ultrazvukovou sondou přes vagínu). V následujícím textu jsou Vám poskytnuty základní informace o plánovaném výkonu.

Účel a povaha výkonu, předpokládaný prospěch: transvaginální a introitální ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové transvaginální vyšetření je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v okolí pochvy. Jedná se zejména o dělohu a vaječníky, případně plod v děloze. Slovo "transvaginální" označuje způsob zavedení ultrazvukové sondy. Při tomto vyšetření Vám lékař zavede sondu přístroje do pochvy. Při introitálním vyšetření zjišťujeme anatomické poměry v malé pánvi, zejména vzájemný poměr močové trubice a močového měchýře. Při introitálním ultrazvukovém vyšetření je sektorová sonda přiložena na poševní vchod při naplněném močovém měchýři a při tomto vyšetření měříme vzájemnou polohu a úhly, které svírají močová trubice a močový měchýř. Tyto úhly jsou posuzovány rovněž při kašli, ke kterému je pacientka při vyšetření vyzvána.

Alternativa k výkonu:

Výkon nemá odpovídající alternativu v jiném zobrazovacím vyšetření, které by poskytlo přímo v ambulanci stejné informace o dané oblasti. Je možno využít jiných zobrazovacích metod jako např. CT nebo magnetickou rezonanci. Při CT vyšetření se však využívá rentgenové záření. Další nevýhodou je časová dostupnost těchto vyšetření.

Příprava před výkonem:

Výkon nevyžaduje od pacientky žádnou speciální přípravu, je nebolestivý, není třeba žádné vyšetření před jeho provedením. Při neakutním vyšetření jej není možné provést při probíhající infekci gynekologických orgánů či menstruaci. Výkon se provádí ambulantně, není k jeho provedení nutná hospitalizace.

Průběh výkonu:

Pacientka se položí na vyšetřovací lehátko, při transvaginálním ultrazvuku je vhodný vyprázdněný močový měchýř. Lékař poté zavede ultrazvukovou sondu do pochvy a provede ultrazvukové vyšetření. Při vyšetření můžete cítit jemný tlak, který je podobný jak při vyšetření v zrcadlech.

Při introitálním ultrazvuku je pacientka vyšetřena v poloze na zádech s pokrčenými mírně odtaženými

koleny, vyšetření se provádí s naplněným močovým měchýřem, ultrazvuková sonda je přiložena k poševnímu vchodu. Při vyšetření je pacientka vyzvána ke kašli.
Celý výkon trvá asi 5-10 minut.

Možná omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti po poskytnutí příslušných zdravotních služeb, pooperační režim:

Výkon se neprovádí v anestézii a nevyžaduje žádnou hospitalizaci a ani omezení v obvyklém způsobu života.

Komplikace výkonu:

Ultrazvukové vyšetření přes pochvu je nebolestivé a nezatěžuje vyšetřovanou ženu žádnými riziky. Nemusíte se obávat ani zanesení infekce do pochvy. Lékař na sondu před vyšetřením nasazuje vždy novou "gumovou ochranu" nebo kondom a potírá ji vodivým gelem, který jednak usnadňuje zavedení a jednak zvyšuje kvalitu výsledného obrazu.

Ve vzácných případech může dojít k rozvoji akutní vulvovaginitidy.

Pokud by se u Vás po výkonu objevily některé komplikace, je nutné neprodleně kontaktovat lékaře.