

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO															
		Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice Ústav laboratorní medicíny Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie	JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO TEL: 532 233 031												
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie		ALERGOLOGIE 2													
Číslo pojištěnce: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Razítko (IČP), jmenovka, podpis lékaře, odbornost:			
Příjmení:															
Jméno:															
Datum narození: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Pohlaví: <table><tr><td>M</td><td>Ž</td></tr></table>		M	Ž
M	Ž														
Dg:															
Pojišťovna:		Nákladové středisko:													
Datum a čas odběru:															
Vyšetřovaný materiál:															
<table><tr><td>☐ periferní krev - srážlivá</td><td>☐ periferní krev - nesrážlivá</td><td>☐ sérum</td><td>☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři</td></tr><tr><td>☐ periferní krev - Li-heparin¹</td><td>☐ plazma</td><td></td><td></td></tr></table>				☐ periferní krev - srážlivá	☐ periferní krev - nesrážlivá	☐ sérum	☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři	☐ periferní krev - Li-heparin ¹	☐ plazma						
☐ periferní krev - srážlivá	☐ periferní krev - nesrážlivá	☐ sérum	☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři												
☐ periferní krev - Li-heparin ¹	☐ plazma														
SPECIFICKÉ IgE, KOMPONENTY															
ALERGENY HMYZU		PYL DŘEVINY													
Specifické IgE	Komponenty	Specifické IgE	Komponenty												
☐ Vosa obecná_c	rVes v 1 (fosfolipáza A1) i	☐ Bříza bradavičnatá_c	rBet v 1 (PR-10) i												
	rVes v 5 i														
☐ Včela medonosná_c	rApi m 1 (fosfolipáza A2) i														
	rApi m 2 (hyaluronidáza A2) i														
	rApi m 3 (kyselá fosfatáza) i														
	rApi m 5 (dipeptidyl peptidáza) i														
	rApi m 10 (carapin) i														
TEST AKTIVACE BAZOFILŮ - BAT ¹		ALERGIE, ATOPIE - MEDIÁTORY													
☐ BAT - vosa		☐ ECP - eosinofilní kationický protein ²													
☐ BAT - včela															
Doplňkové informace:		1 Stanovení BAT je prováděno pouze z krve v Li-heparin. Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru do 13. hod. 2 Dodat plnou srážlivou krev do 1 hod. od odběru (nutné uvést čas odběru) nebo sérum separované do 2 hod. od odběru. Sérum lze uchovat při 4-8 °C max. 5 dní, déle nutno zamrazit. c ... LEIA i ... ImmunoCAP													

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO															
		Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice Ústav laboratorní medicíny Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie	JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO TEL: 532 233 031												
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie		ALERGOLOGIE 2													
Číslo pojištěnce: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Razítko (IČP), jmenovka, podpis lékaře, odbornost:			
Příjmení:															
Jméno:															
Datum narození: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Pohlaví: <table><tr><td>M</td><td>Ž</td></tr></table>		M	Ž
M	Ž														
Dg:															
Pojišťovna:		Nákladové středisko:													
Datum a čas odběru:															
Vyšetřovaný materiál:															
<table><tr><td>☐ periferní krev - srážlivá</td><td>☐ periferní krev - nesrážlivá</td><td>☐ sérum</td><td>☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři</td></tr><tr><td>☐ periferní krev - Li-heparin¹</td><td>☐ plazma</td><td></td><td></td></tr></table>				☐ periferní krev - srážlivá	☐ periferní krev - nesrážlivá	☐ sérum	☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři	☐ periferní krev - Li-heparin ¹	☐ plazma						
☐ periferní krev - srážlivá	☐ periferní krev - nesrážlivá	☐ sérum	☐ Dodělovka/materiál již v laboratoři												
☐ periferní krev - Li-heparin ¹	☐ plazma														
SPECIFICKÉ IgE, KOMPONENTY															
ALERGENY HMYZU		PYL DŘEVINY													
Specifické IgE	Komponenty	Specifické IgE	Komponenty												
☐ Vosa obecná_c	rVes v 1 (fosfolipáza A1) i	☐ Bříza bradavičnatá_c	rBet v 1 (PR-10) i												
	rVes v 5 i														
☐ Včela medonosná_c	rApi m 1 (fosfolipáza A2) i														
	rApi m 2 (hyaluronidáza A2) i														
	rApi m 3 (kyselá fosfatáza) i														
	rApi m 5 (dipeptidyl peptidáza) i														
	rApi m 10 (carapin) i														
TEST AKTIVACE BAZOFILŮ - BAT ¹		ALERGIE, ATOPIE - MEDIÁTORY													
☐ BAT - vosa		☐ ECP - eosinofilní kationický protein ²													
☐ BAT - včela															
Doplňkové informace:		1 Stanovení BAT je prováděno pouze z krve v Li-heparin. Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru do 13. hod. 2 Dodat plnou srážlivou krev do 1 hod. od odběru (nutné uvést čas odběru) nebo sérum separované do 2 hod. od odběru. Sérum lze uchovat při 4-8 °C max. 5 dní, déle nutno zamrazit. c ... LEIA i ... ImmunoCAP													