

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO



Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice
Ústav laboratorní medicíny
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Imunologie a molekulární mikrobiologie

JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO
TEL.: 532 233 031

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie - IMUNOPATOLOGIE

Nákladové středisko:	Telefon:	Razítko (IČP), jmenovka a podpis lékaře, odbornost:
Číslo pojištění:		
Jméno a příjmení:		
Datum narození:	Pohlaví: muž žena	
Dg.: Další dg.:	Pojišťovna:	

Odebral:	Datum a čas odběru:
----------	---------------------

Vyšetřovaný materiál:	☐ STATIM	☐ Dodělovka / materiál již v laboratoři
☐ periferní krev - srážlivá	☐ sérum	☐ likvor ¹
☐ periferní krev - nesrážlivá	☐ plazma	☐ jiný:

Protilátky proti strukturám buněčného jádra a cytoplazmy	Gastroenterologický soubor	Neurologický soubor
☐ ANA IgG IIF (T)	☐ AMA IgG IIF	☐ autoimunitní encefalitidy IIF
☐ ANCA IgG IIF (T)	☐ AMA M2 IgG	(anti-NMDAR, AMPA1, AMPA2, CASPR2, LG1, GABAR1/B2 ... jednotlivě)
☐ anti-PR3 IgG S	☐ anti-LKM IgG IIF	☐ anti-NMDAR IIF
☐ anti-MPO IgG S	☐ anti-LKM1 IgG	☐ paraneoplastické protilátky IIF ³
☐ anti-dsDNA IgG IIF (T)	☐ ASMA IgG IIF	(anti-Hu, Ri, Yo, CV2, amfifysin, Ma1, Ma2)
☐ anti-dsDNA IgG	☐ anti-vnitřní faktor IgG (anti-IF)	☐ anti-AQP4 IIF (T)
☐ anti-ssDNA IgG	☐ anti-parietální buňky IgG (APCA)	☐ anti-MOG IIF (T)
☐ anti-DNP IgG	☐ anti-gliadin deamidovaný IgA/IgG	Cirkulující imunokomplexy
☐ anti-nukleosomy IgG	☐ anti-tkáňová transglutamináza IgA/IgG (tTG)	☐ CIK C1q
☐ anti-histon IgG	☐ anti-endomysium IgA/IgG (EMA) IIF (T)	Průtoková cytometrie²
☐ ENA screening IgG	☐ anti-S. cerevisiae IgA/IgG (ASCA)	☐ Subpopulace lymfocytů (T/B/NK)
☐ ENA typizace při pozitivitě ENA scr. (anti-Ro, La, Sm, snRNP, Scl-70, Jo-1)	☐ GASTRO PANEL (anti-IF IgG, APCA IgG, gliadin DA IgA/IgG, tTG IgA/IgG, ASCA IgA/IgG)	☐ T-lymfocyty (CD3/CD4/CD8) - abs. počet
☐ anti-Ro/SS-A	☐ ARA IgA/IgG IIF	☐ Regulační T-lymfocyty (T-reg)
☐ anti-La/SS-B	☐ anti-kravské mléko IgA/IgG	☐ Gamma-delta T-lymfocyty
☐ anti-Sm	Nefrologický soubor	☐ Efektorové/paměťové T-lymfocyty
☐ anti-U1snRNP	☐ anti-PLA2R IgG IIF (T)	☐ Aktivační znaky (HLA-DR, CD69) ⁴
☐ anti-Scl-70	☐ anti-PLA2R IgG	☐ Subpopulace monocytů (CD14/CD16) ⁵
☐ anti-Jo-1	☐ anti-GBM IgG S	☐ Hodnocení nálezu
Protilátky proti fosfolipidům	Dermatologický soubor	Doplňkové informace:
☐ ACLA IgG/IgM	☐ anti-ICS IgG IIF (T)	
☐ ACLA IgA	☐ anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 - "pemfigus"	
☐ anti-β2 GP1 IgG/IgM	☐ anti-BM IgG (jícen/solí dělená kůže) IIF (T)	
☐ anti-β2 GP1 IgA	☐ anti-BP 180, anti-BP 230 - "pemfigoid"	
☐ anti-annexin V IgG/IgM		

S ... Vyšetření dostupná v režimu STATIM jsou označena příznakem S

IIF ... Nepřímá imunofluorescence, v případě pozitivní IIF doplněna titrace (T)

¹ Vyšetření likvoru provádíme pouze u neurologického souboru. ² Jen z nesrážlivé krve.

³ V hraničních a pozitivních případech bude doplněn imunoblot - IB (anti-Hu, Yo, Ri, CV2, amfifysin, Ma-2/Ta, SOX1, Tr, Zic4, GAD65, recoverin, titin).

⁴ Vyšetření indikujte s T-lymfocyty (CD3/4/8) nebo Subpopulace lymfocytů (T/B/NK).

⁵ Vyšetření indikujte s vyšetřením Subpopulace lymfocytů (T/B/NK).