

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO



Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice
Ústav laboratorní medicíny
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Imunologie a molekulární mikrobiologie

JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO
TEL.: 532 233 389

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie - INFEKČNÍ IMUNOLOGIE

Nákladové středisko:	Telefon:	Razítko (IČP), jmennovka a podpis lékaře, odbornost:
Číslo pojištěnce:		
Jméno a příjmení:		
Datum narození:	Pohlaví: muž žena	
Dg.:	Další dg.:	Pojišťovna:

Odebral: _____ Datum a čas odběru: _____

Vyšetřovaný materiál:	<input type="checkbox"/> STATIM ¹	<input type="checkbox"/> Dodělavka / materiál již v laboratoři
<input type="checkbox"/> periferní krev - srážlivá	<input type="checkbox"/> likvor	<input type="checkbox"/> plazma
<input type="checkbox"/> periferní krev - EDTA	<input type="checkbox"/> synoviální tekutina	<input type="checkbox"/> stěr / výtěr z:
<input type="checkbox"/> sérum	<input type="checkbox"/> pupečnicková krev	<input type="checkbox"/> jiné:

HEPATITIDY, HIV	STD	ostatní - VIRY
<input type="checkbox"/> hepatitidy dif. dg. S	<input type="checkbox"/> RPR (screen.)	<input type="checkbox"/> Parvovirus B19 IgG, IgM
<input type="checkbox"/> HAV IgG, IgM S	<input type="checkbox"/> Treponema pallidum Ig celk. (screen.)	<input type="checkbox"/> Enterovirus sp. IgG, IgM, IgA
<input type="checkbox"/> HBc Ig celkové S	<input type="checkbox"/> Treponema pallidum IgG, IgM (konfirm.)	<input type="checkbox"/> Parotitis (příušnice) IgG, IgM
<input type="checkbox"/> HBc IgM S	<input type="checkbox"/> Treponema pallidum - WB ² (konfirm.)	<input type="checkbox"/> Rubeola (zarděnky) IgG, IgM
<input type="checkbox"/> HBe Ig celkové	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> konfirmace při pozitivitě screeningu	<input type="checkbox"/> Morbilli (spalničky) IgG, IgM S
<input type="checkbox"/> HBs Ig celkové	<input type="checkbox"/> Treponema pallidum IgG - ITS ³	<input type="checkbox"/> MRZ reakce - ITS ³
<input type="checkbox"/> HBeAg	<input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis IgG, IgM, IgA	ostatní - BAKTERIE
<input type="checkbox"/> HBsAg S	RESPIRAČNÍ VIRY	<input type="checkbox"/> Salmonella Ig celkové - Widalova r.
<input type="checkbox"/> HCV Ig celkové S	<input type="checkbox"/> Influenzavirus A IgM, Influenz. B IgM	<input type="checkbox"/> Campylobacter jejuni IgG, IgA
<input type="checkbox"/> HDV Ig	<input type="checkbox"/> RS virus IgM	<input type="checkbox"/> Yersinia IgG, IgA
<input type="checkbox"/> HEV IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Adenovirus IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Francisella tularensis Ig celkové
<input type="checkbox"/> HIV 1,2 (Ag + Ab) S	SARS-CoV-2	<input type="checkbox"/> Listeria monocytogenes Ig celkové
KLIŠTÁTY PŘENÁŠENÁ ONEMOCNĚNÍ	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 Ig celkové anti-S	<input type="checkbox"/> Bartonella IgG, IgM
<input type="checkbox"/> Borrelia burgdorferi sensu lato IgG, IgM	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 Ig celkové anti-N	<input type="checkbox"/> Helicobacter pylori IgG, IgA
<input type="checkbox"/> Borrelia burgdorferi sensu lato IgG, IgM - WB ²	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 antigen - stěr ⁴ S	postvakcinační protilátky
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WB vyšetřit při pozitivitě ELISA	<input type="checkbox"/> N antigen (krev) - diagnosticky	<input type="checkbox"/> Klíšťová encefalitida IgG
<input type="checkbox"/> Borrelia burgdorferi sensu lato IgG, IgM - ITS ³	<input type="checkbox"/> N antigen (krev) - prognosticky	<input type="checkbox"/> Rubeola (zarděnky) IgG
<input type="checkbox"/> CXCL-13 z likvoru	RESPIRAČNÍ BAKTERIE	<input type="checkbox"/> Morbilly (spalničky) IgG
<input type="checkbox"/> Klíšťová encefalitida IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoniae IgG, IgM, IgA	<input type="checkbox"/> Parotitis (příušnice) IgG - postvakcin.
<input type="checkbox"/> Klíšťová encefalitida IgG, IgM v likvoru	<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Haemophilus influenzae IgG
<input type="checkbox"/> Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Bordetella pertussis toxin IgG, IgA	<input type="checkbox"/> Corynebacterium diphtheriae IgG
HERPESVIRY	<input type="checkbox"/> Bordetella pertussis toxin IgG	<input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae IgG
<input type="checkbox"/> CMV IgG, IgM	<input type="checkbox"/> Bordetella parapertussis IgG, IgA	<input type="checkbox"/> Clostridium tetani IgG
<input type="checkbox"/> CMV IgG - avidita ²	<input type="checkbox"/> TBC / QuantiFERON-TB ⁵	KFR
<input type="checkbox"/> EBV (VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG)	Doplňkové informace:	<input type="checkbox"/> CMV
<input type="checkbox"/> HSV 1,2 IgG, IgM		<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii
<input type="checkbox"/> HSV 1,2 IgG		1 Vyšetření dostupná v režimu STATIM jsou označena příznakem S.
<input type="checkbox"/> VZV IgG, IgM		2 Nelze objednat samostatně.
<input type="checkbox"/> HHV 6 IgG		3 ITS = intratekální syntéza protilátek. Pro vyšetření je nutné odebrat vzorek srážlivé krve a likvoru s časovým rozestupem odběru max. 4 h. (optimum 30 min). Pokud nebudou z OKB dostupné údaje potřebné pro zhodnocení testu (albumin a celkové Ig v séru a likvoru), budou došetřeny.
PARAZITI		4 Nutno dodat s vytištěnou ežádankou.
<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgG, IgM		5 Odběr pondělí - čtvrtek, pokud po dni odběru nenásleduje státní svátek. Nutno dodat min. 4,9 ml krve do zkumavky s Li-heparinem bez gelu.
<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgA, IgE		
<input type="checkbox"/> Toxoplasma gondii IgG - avidita ²		
<input type="checkbox"/> Toxocara canis IgG		
<input type="checkbox"/> Toxocara canis IgG - avidita ²		

1 Vyšetření dostupná v režimu STATIM jsou označena příznakem S.

2 Nelze objednat samostatně.

3 ITS = intratekální syntéza protilátek. Pro vyšetření je nutné odebrat vzorek srážlivé krve a likvoru s časovým rozestupem odběru max. 4 h. (optimum 30 min). Pokud nebudou z OKB dostupné údaje potřebné pro zhodnocení testu (albumin a celkové Ig v séru a likvoru), budou došetřeny.

4 Nutno dodat s vytištěnou ežádankou.

5 Odběr pondělí - čtvrtek, pokud po dni odběru nenásleduje státní svátek. Nutno dodat min. 4,9 ml krve do zkumavky s Li-heparinem bez gelu.