
Příloha k informovanému souhlasu s plánovaným výkonem

Vyšetření pochvy v zrcadlech

V rámci snahy o Vaši dokonalou informovanost o Vašem zdravotním stavu nabízíme doplňující písemný materiál, ve kterém se snažíme podat co nejvíce informací o plánovaném léčebném postupu. Základní informace Vám byla podána ošetřujícím lékařem ať již v ambulantním traktu či na lůžkovém oddělení kliniky. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o spoustu nových a svým obsahem velmi závažných sdělení, které jistě při prvním ústním sdělení všechny nemůžete v plném rozsahu vstřebat a adekvátně zhodnotit.

Vážená paní,

na základě Vašich předchozích výsledků u Vás bylo indikováno provedení vyšetření pochvy v zrcadlech. V následujícím textu jsou Vám poskytnuty základní informace o plánovaném výkonu.

Co je vyšetření pochvy v zrcadlech a jaký je důvod (indikace) k výkonu, předpokládáný přínos:

Vyšetření pochvy v zrcadlech patří k základnímu gynekologickému vyšetření. Provádí se zavedením horního a dolního poševního zrcadla po zadní poševní stěně do pochvy, slouží k zlepšení přehlednosti při vyšetření pochvy. V urologické praxi se využívají k vyloučení patologických útvarů v pochvě, jako možného zdroje urologických potíží. Jsou to především vezikovaginální fistula (patologická komunikace močového měchýře s pochvou), ureterovaginální fistula (patologická komunikace močovodu s pochvou), cystokéla (prolaps močového měchýře do pochvy) a v neposlední řadě i přítomnost cizího tělesa.

Alternativní výkony:

Vyšetření nemá odpovídající alternativu v zobrazovacích vyšetřeních. K posouzení patologické komunikace s pochvou mohou posloužit i radiologické zobrazovací metody.

Jaký je postup výkonu:

Vyšetření je prováděno v lokální anestezii v gynekologické poloze s pokrčenými dolními končetinami. Do pochvy jsou zavedena poševní zrcadla, na nichž ne nanesena dostatečná vrstva znecitlivujícího gelu. Následně je prohlédnuta poševní stěna a vyloučena přítomnost cizího tělesa. K posouzení patologické komunikace je nejprve provedeno optické vyšetření pochvy. Poté je močový měchýř naplněn obarvenou sterilní tekutinou a pozorován případný průnik obarvené tekutiny do pochvy, případně je do pochvy zaveden tampón, pokud je zbarven, je tím prokázána přítomnost komunikace.

Možná omezení po výkonu a pracovní neschopnost:

Není vyžadován po vyšetření speciální režim. Není nutná pracovní neschopnost

Možné komplikace a rizika:

Po vyšetření může dojít k rozvoji vulvovaginitidy, tedy zánětu pochvy, riziko vzniku této infekce je však poměrně nízké. Rovněž je možné po vyšetření pozorovat otisk krve na spodním prádle, je tedy vhodné v den vyšetření nosit vložku. Při výrazně zúženém poševním vchodu může dojít nešetrnou

manipulací k natržení hráze, projevující se krvácením a svěděním, v naprosté většině případů se zhojí spontánně, navíc riziko této komplikací je raritní. Jinak se jedná o poměrně bezpečné vyšetření, které není zatíženo výrazným rizikem vzniku komplikací.

Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních:

Při vyšetření nález zhodnotí lékař a doporučí Vám další postup léčby a kontroly dle aktuálního nálezů.